

TRIGO BLANDO DE INVIERNO

TBO 2018



PIBRAC

Representante: SYNGENTA

Año de registro: 2016 (Francia)

Protección: COMUNITARIA

Espiga: Aristada

Altura de la planta: MEDIA (- 2 cm/BOTTICELLI; + 10 cm/CAMARGO;
+ 7 cm/CHAMBO; + 5 cm/MARCOPOLO; - 1 cm/NOGAL)

Índice productivo medio por año (%)

	RED GENVCE			ÍNDICE MEDIO
	2015-16	2016-17	2017-18	
PIBRAC	119,7	107,3	113,2	113,4
BOTTICELLI (Testigo)	110,4	102,9	101,4	104,9
CAMARGO		102,9	105,7	
CHAMBO		104,0	102,9	
MARCOPOLO		111,2	107,1	
NOGAL (Testigo)	89,6	97,1	98,6	95,1
Índice 100 (kg/ha)	6664	4819	6296	5926
Número de ensayos	11	19	18	

Índice productivo por zona (%)

	Zonas Frías	Zonas Templadas
PIBRAC	111,0	110,4
BOTTICELLI (Testigo)	100,9	102,6
CAMARGO	108,2	100,6
CHAMBO	107,0	99,7
MARCOPOLO	110,1	108,3
NOGAL (Testigo)	99,1	97,4
Índice 100 (kg/ha)	5077	6341
Número de ensayos	19	16

CICLO

Tipo: INVIERNO

Fecha de espigado: MEDIA A TARDÍA (+ 6 días/BOTTICELLI; + 4 días/CAMARGO; + 3 días/CHAMBO; 0 días/MARCOPOLO; + 6 días/NOGAL)

RESISTENCIA A ENFERMEDADES FOLIARES Y ACCIDENTES

Encamado: MEDIA

Oídio (*Blumeria graminis f. sp. tritici*): MEDIA A ALTA

Septoria (*Septoria tritici*): MEDIA A ALTA

Roya amarilla (*Puccinia striiformis*): MEDIA A ALTA


Roya parda (*Puccinia triticina*): BAJA A MEDIA

CALIDAD DEL GRANO

Peso hectolítrico: MEDIO A ALTO (- 2,9 kg/hl/BOTTICELLI;
+ 0,8 kg/hl/CAMARGO; + 2,8 kg/hl/CHAMBO; + 1,5 kg/hl/MARCOPOLO; - 0,4 kg/hl/NOGAL)

Peso de 1000 granos: MEDIO (- 6,5 g/BOTTICELLI; + 0,4 g/CAMARGO;
+ 0,7 g/CHAMBO; - 0,6 g/MARCOPOLO; + 3,3 g/NOGAL)

Contenido en proteína: BAJO A MEDIO (- 0,1 %/BOTTICELLI;
- 0,4 %/CAMARGO; - 0,5 %/CHAMBO; - 1,1 %/MARCOPOLO; - 0,8 %/NOGAL)



Grupo de calidad: 3 - 5 (W:161; P/L:1,1)