

# TRIGO BLANDO DE INVIERNO

TBO 2017

# FALADO



**Representante:** SYNGENTA

**Año de registro:** 2013 (Francia)

**Protección:** COMUNITARIA

**Espiga:** Aristada

**Altura de la planta:** MEDIA A ALTA (+ 2 cm/BOTTICELLI; + 18 cm/CAMARGO; + 15 cm/CHAMBO; + 13 cm/MARCOPOLO; + 3 cm/NOGAL)

## Índice productivo medio por año (%)

	RED GENVCE			ÍNDICE MEDIO
	2014-15	2015-16	2016-17	
<b>FALADO</b>	118,2	127,8	99,6	115,2
<b>BOTTICELLI</b>		115,7	106,1	
<b>CAMARGO</b>			106,0	
<b>CHAMBO</b>			107,1	
<b>MARCOPOLO</b>			114,6	
<b>NOGAL (Testigo)</b>	100,0	100,0	100,0	100,0
Índice 100 (kg/ha)	4714	5508	4677	4966
Número de ensayos	14	26	19	

## Índice productivo por zona (%)

	Zonas Frías	Zonas Templadas
<b>FALADO</b>	118,0	110,8
<b>BOTTICELLI</b>	114,8	107,0
<b>NOGAL (Testigo)</b>	100,0	100,0
Índice 100 (kg/ha)	5161	5374
Número de ensayos	22	23

## CICLO

**Tipo:** INVIERNO (medio alternativo)

**Fecha de espigado:** MEDIA A TARDÍA (+ 4 días/BOTTICELLI; + 4 días/CAMARGO; + 3 días/CHAMBO; 0 días/MARCOPOLO; + 4 días/NOGAL)

## RESISTENCIA A ENFERMEDADES FOLIARES Y ACCIDENTES

**Encamado:** BAJA

**Oídio (*Blumeria graminis* f. sp. *tritici*):** MEDIA

**Septoria (*Septoria tritici*):** MEDIA A ALTA

**Roya amarilla (*Puccinia striiformis*):** BAJA


**Roya parda (*Puccinia triticina*):** BAJA

## CALIDAD DEL GRANO

**Peso hectolítrico:** MEDIO (- 3,6 kg/hl/BOTTICELLI; + 0,4 kg/hl/CAMARGO; + 2,2 kg/hl/CHAMBO; + 0,4 kg/hl/MARCOPOLO; - 1,2 kg/hl/NOGAL)

**Peso de 1000 granos:** MEDIO (- 5,2 g/BOTTICELLI; + 1,2 g/CAMARGO; + 1,2 g/CHAMBO; + 0,1 g/MARCOPOLO; + 5,5 g/NOGAL)

**Contenido en proteína:** MEDIO (+ 0,7 %/BOTTICELLI; + 0,1 %/CAMARGO; 0 %/CHAMBO; - 0,5 %/MARCOPOLO; - 0,9 %/NOGAL)



**Grupo de calidad:** 2 - 5 (W:229; P/L:1,5)