

TRIGO BLANDO DE INVIERNO

TBO 2017

COSMIC



Representante: AGRUSA
Año de registro: 2013 (Italia)
Protección: COMUNITARIA

Espiga: Mocha

Altura de la planta: MEDIA (- 2 cm/BOTTICELLI; + 13 cm/CAMARGO;
+ 10 cm/CHAMBO; + 8 cm/MARCOPOLO; - 1 cm/NOGAL)

Índice productivo medio por año (%)

	RED GENVCE			ÍNDICE MEDIO
	2014-15	2015-16	2016-17	
COSMIC	112,7	121,3	106,2	113,4
BOTTICELLI		115,7	106,1	
CAMARGO			106,0	
CHAMBO			107,1	
MARCOPOLO			114,6	
NOGAL (Testigo)	100,0	100,0	100,0	100,0
Índice 100 (kg/ha)	4714	5508	4677	4966
Número de ensayos	14	26	19	

Índice productivo por zona (%)

	Zonas Frías	Zonas Templadas
COSMIC	112,2	115,8
BOTTICELLI	114,8	107,0
NOGAL (Testigo)	100,0	100,0
Índice 100 (kg/ha)	5161	5374
Número de ensayos	22	23

CICLO

Tipo: INVIERNO

Fecha de espigado: TARDÍA (+ 8 días/BOTTICELLI; + 8 días/CAMARGO; + 7 días/CHAMBO; + 4 días/MARCOPOLO; + 8 días/NOGAL)

RESISTENCIA A ENFERMEDADES FOLIARES Y ACCIDENTES

Encamado: BAJA

Oídio (*Blumeria graminis f. sp. tritici*): MEDIA A ALTA

Septoria (*Septoria tritici*): MEDIA A ALTA


Roya amarilla (*Puccinia striiformis*): MEDIA A ALTA

CALIDAD DEL GRANO

Peso hectolítrico: BAJO (- 8,3 kg/hl/BOTTICELLI; - 4,3 kg/hl/CAMARGO;
- 2,5 kg/hl/CHAMBO; - 4,3 kg/hl/MARCOPOLO; - 5,9 kg/hl/NOGAL)

Peso de 1000 granos: MEDIO A BAJO (- 10,8 g/BOTTICELLI;
- 4,5 g/CAMARGO; - 4,5 g/CHAMBO; - 5,5 g/MARCOPOLO; - 0,2 g/NOGAL)

Contenido en proteína: BAJO (- 0,2 %/BOTTICELLI; - 0,8 %/CAMARGO;
- 0,9 %/CHAMBO; - 1,4 %/MARCOPOLO; - 1,7 %/NOGAL)



Grupo de calidad: 4 (W:96; P/L:0,5)